



تحلیل کوتاه همه گیری کووید-۱۹ استان اصفهان شماره ۳

تحلیل زیر بر اساس اطلاعات مرتبط با همه گیری کووید-۱۹ در استان اصفهان از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۹/۲/۳ تنظیم شده است.

مقایسه میزان بروز استاندارد شده کووید-۱۹ در شهرستان های مختلف استان اصفهان قبل و بعد از ۲۱ فروردین ۱۳۹۹



تغییرات بروز بیماری کووید-۱۹ در شهرستان های استان اصفهان در قبل و بعد از ۲۱ فروردین ۱۳۹۹



همانگونه که در نمودار مشاهده می شود بروز استاندارد شده سنی بیماری در شهرستان های فریدونشهر و خور و بیابانک افزایش حدود ۲۰٪ را نشان می دهند. در فریدونشهر میزان بروز بیماری از ۸/۱ نفر در هر ده هزار نفر به ۹/۸ نفر در هر ده هزار نفر و در خور و بیابانک میزان بروز بیماری از ۶/۷ نفر در هر ده هزار نفر به ۸ نفر در هر ده هزار نفر افزایش یافته است.

در تیران و کرون میزان بروز بیماری تغییری را نشان نمی دهد و سایر شهرستان ها در دو هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ماه نسبت به قبل از آن با کاهش بروز بیماری مواجه بوده اند. کمترین کاهش را در بروز بیماری در شهرستان نایین مشاهده می کنیم که حدود ۲۳ درصد به دست آمده است و بیشترین کاهش را در بروز بیماری در نطنز با حدود ۸۵ درصد مشاهده می کنیم.

اردستان تا قبل از ۲۱ فروردین ماه با ۳۵ نفر در هر ده هزار نفر بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. نطنز ۳۱/۲، چادگان ۳۰/۵ و نایین با ۲۷ نفر در هر ده هزار نفر بعد از آن قرار گرفته اند. در طی دو هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نطنز، اردستان و چادگان کاهش قابل ملاحظه ای را نشان داده اند اما نایین با وجود این که رتبه چهارم را از نظر بروز داشته است اما کمترین کاهش را نشان داده است. تغییرات در شهرستان هایی که میزان بروز کمی داشته اند حتی در مواردی مانند شهرستان های فریدونشهر و خور و بیابانک که با افزایش همراه بوده اند کمتر از سرعت کاهش بروز در نایین جلب توجه می کند.

پیشنهادات:

توجه با این نکته ضروری است که مجموعه اقداماتی که منجر به کاهش چشمگیر بروز در نطنز شده است تقویت شده و در صورتی که همان استراتژی در نایین مورد استفاده قرار گرفته عوامل کاهش تاثیر آن مورد بررسی قرار گیرند.